

## ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチンの接種間隔について

種類	接種開始月齢	回数	接種間隔
ヒブワクチン	生後2～7月に至るまで (標準的な接種時期)	初回3回 追加1回	初回：27日以上、標準的には56日までの間隔をおく。 ※2回目及び3回目は生後12月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わないこと。(追加接種は可能) 追加：初回終了後7月以上、標準的には13月までの間隔をおく。 ※2回目及び3回目を行わずに12月を超えた場合は、初回接種の最後の注射後27日以上の間隔をおいて1回
	生後7月に至った日の翌日～12月に至るまで	初回2回 追加1回	初回：27日以上、標準的には56日までの間隔をおく。 ※2回目は生後12月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わないこと。(追加接種は可能) 追加：初回終了後7月以上、標準的には13月までの間隔をおく。 ※2回目を行わずに12月を超えた場合は、初回接種の最後の注射後27日以上の間隔をおいて1回
	生後12月に至った日の翌日～60月に至るまで	1回	
小児肺炎球菌ワクチン	生後2～7月に至るまで (標準的な接種時期)	初回3回 追加1回	初回：標準的には生後12月までに27日以上の間隔をおく。 ※2回目が生後12月を超えた場合は、3回目を行わないこと。(追加接種は可能) 3回目が生後12月を超えた場合は、24月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わないこと。(追加接種は可能) 生後24月を超えた場合は2回目及び3回目を行わないこと。(追加接種は可能) 追加：初回終了後60日以上の間隔をおいた後で、生後12月に至った日以降に1回
	生後7月に至った日の翌日～12月に至るまで	初回2回 追加1回	初回：標準的には生後13月までに27日以上の間隔をおく。 ※2回目は生後24月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わないこと。(追加接種は可能) 追加：初回終了後60日以上の間隔をおいた後で、生後12月に至った日以降に1回
	生後12月に至った日の翌日～24月に至るまで	2回	60日以上の間隔をおく。
	生後24月に至った日の翌日～60月に至るまで	1回	